

Doporučení k biologické ochraně vinic 12/2023 – 8. 8. 2023

Situace

Vinice se nachází ve fázi začátku zaměkání u raně zrajících odrůd.

Po vydatných deštích z minulého týdne a víkendu, při dlouhém ovlhčení listů na neošetřených částech rostlin, docházelo k infekcím plísně révy. Na mladých přírůstcích a zálistcích se mohou začít za několik dní objevovat nové olejové skvrny.

Citlivost k napadení padlím révovým se pomalu snižuje. Na porostech se objevují starší infekce, které jsou zpravidla dobře ošetřené.

V následujících dnech doporučujeme provést ošetření porostů v pravidelném intervalu 10 - 12 dnů od posledního ošetření.

Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Nové infekce padlí jsou již v tomto období zaznamenávány sporadicky. Vysoká vosková vrstva na bobulích chrání bobule před novým napadením. Při napadení celých hroznů však doporučuji kurativní ošetření pomocí COCANY v 2% koncentraci. Pokud se rozhodnete pro tento kurativní zásah, nedoporučuji jej dlouho odkládat, protože pozdní reakce nemusí být dostatečná a zpravidla se musí zákrok opakovat. Toto kurativní ošetření je vhodné provést po odlistění zóny hroznů, tak aby byly hrozny plně omyty. Následně doporučujeme provést fungicidní ošetření v plných dávkách.



Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [VitiSan](#) 6 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2% vinice bez výskytu patogenu

Nebo [Fertipen S](#) 4 l/h + [VitiSan](#) 4 kg/ha vinice bez výskytu patogenu

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 10 kg/ha + [WETCIT](#) 0,3% vinice s výskytem patogenu

[Cocana](#) 2% roztok v 1000 - 1500 l vody/ha do zóny hroznů – kurativní ošetření

Dávka vody **500 l** vody/ha

[Solfex](#) 20 kg/ha 3-4 dny po provedeném ošetření postřikem

Upozorňuji, že ochranná lhůta u Síry BL je 56 dnů!!! Fertipen S nemá ochrannou lhůtu stanovenou.

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

V současném období je vhodné provést ošetření porostů a nepodceňovat riziko napadení mladých částí rostlin – zálistky a mladé listy na horní hraně listové plochy, tak aby na rostlinách byla dostatečná funkční listová plocha potřebná k dozrávání hroznů. Nadále při delším ovlhčení porostů může docházet k dalšímu šíření patogenu. Riziko není pouze po ovlhčení deštěm, ale i ovlhčení listů rosou při nízkých ranních teplotách, které se v těchto dnech vyskytují.

Doporučené ošetření:

[Altela](#) 1 l/ha + [Flowbrix](#) 1 l/ha u BIO vinic bez výskytu patogenu

[Altela](#) 1,5 - 2 l/ha + [Flowbrix](#) 1,5 - 2 l/ha u BIO vinic s výskytem patogenu

Dávka vody **500 l** vody/ha

Ochranná lhůta u Flowbrixu je 21 dnů!!!

Agrotechnika

V černém úhoru je možné provádět **kultivaci** meziřadí, a tím uvolňovat dusík rostlinám, který rostliny potřebují v období zaměkání bobulí.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

1) Válení porostu

nebo

2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12 - 15 cm.

Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů), doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3 - 5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4 l/ha.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se začíná objevovat vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#), obsahuje 13,2 % mikrorozpusťný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Martin Vrabec

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 776 088](tel:+420732776088)

vrabec@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.