

Doporučení k biologické ochraně vinic 6/2023 – 13. 6. 2023

Situace

Vinice se nacházejí ve fázi těsně před začátkem kvetení. Na teplých lokalitách časně kvetoucí odrůdy CHAR již můžete pozorovat odpadávající květní čepičky a začátek kvetení. Na ostatních odrůdách je předpokládáný začátek kvetení koncem tohoto týdne.

Na porostech se již vyskytují první infekce patogenů, a to jak padlí révy, tak i sporulující mycelium plísně révové.

V následujících dnech doporučujeme provést důkladné ošetření před začátkem kvetení révy!

Padlí révy (*Erysiphe necator*)

V současné době jsou již nalézány výskyty mycelia padlí viditelné pouhým okem, a to jak na listech, tak i na květenstvích. Podmínky pro rozvoj padlí v tomto týdnu jsou optimální. V následujících dnech doporučuji provést důkladné ošetření porostů před začátkem kvetení révy.



Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [VitiSan](#) 3 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2% vinice bez výskytu patogenu

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 6 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2% vinice s výskytem patogenu

Dávka vody 300 – 400 l vody/ha

Ve srážkově nestabilním období je možné vyměnit [WETCIT](#) jako smáčedlo za [HELIOSOL](#), který působí v dávce 0,2 % – jako „lepidlo“ a po zaschnutí snižuje riziko smyvu deštěm.

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

Nyní jsou již nalézány olejové skvrny i sporulující mycelium patogenu na spodní straně listů na rostlinách. V lokalitách s četnými srážkami minulého období je možné nacházet i plíseň révou na nerozkvetlých hroznech. Pro šíření patogenu v následujících dnech, kde v předpovědi počasí je signalizováno beze srážek, plně dostačuje i ovlhčení listů dlouho trvající rosou. Doporučujeme provést důkladné ošetření révy před začátkem kvetení.



Doporučené ošetření:

[Memcomba](#) 1 l/ha + [Flowbrix](#) 1 l/ha u BIO vinic bez výskytu patogenu

[Altela](#) 1,5 l/ha + + [Flowbrix](#) 1,5 l/ha u BIO vinic s výskytem patogenu

[Alginure](#) 4,5 l/ha + [Flowbrix](#) 0,5 l/ha u vinic bez certifikace BIO v IP režimu

Dávka vody 300 - 400 l vody/ha

Obaleč mramorovaný a obalečik jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

V květenstvích je již možné pozorovat housenky obalečů první generace.

Nálet první generace již skončil obalečů můžete sledovat na tomto odkazu:

<https://www.biocont-profi.cz/signalizace/obaleci/>

Agrotechnika

V černém úhoru doporučujeme prokypřit mělce (cca 5 - 8 cm) půdu, a tím pozvolna uvolnit dusík pro rostliny. V době květu již s půdou „nehýbat“!!!

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

- 1) Válení porostu
nebo
- 2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12 - 15 cm.
- 3) V meziřadí se zeleným hnojením je již měli být tyto porosty ukončeny

Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů) doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3 - 5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4 l/ha.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se začíná objevovat vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#), obsahuje 13,2 % mikrorozpustný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Doplnění bóru

Dále je možné před květem révy doplnit bór, tak aby byl zajištěn plně klíčící pyl.

Možné použít [Tradebor Mo](#), který obsahuje bórethanolamin 105 g/l + molybden 12 g/l. **Doporučená dávka je 0,3 l/ha.** Také i v tomto případě je možné přidávat do tank mixu.

Otevírací doba skladu Hustopeče

Upozorňujeme že v pátek 23. 6. 2023 bude z důvodů přerušení dodávky elektrické energie sklad Hustopeče uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Martin Vrabec

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 776 088](tel:+420732776088)

vrabec@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.