

Doporučení k biologické ochraně vinic 7/2023 – 26. 6. 2023

Situace

Vinice se nacházejí ve fázi dokvétání u pozdně kvetoucích odrůd a ve fázi špendlíkové hlavičky až broku u raně kvetoucích odrůd.

Na porostech se již vyskytuje infekce plísně révové, a to jak na listech ve formě olejových skvrn i sporulujícího mycelia na spodní straně listů, tak je možné nalézat i napadená květenství ve sporulující formě.

Na odkvetlých květenstvích, ale i na listech, nacházíme infekce padlí révového, které bude mít v následujících dnech optimální podmínky pro rozvoj – doporučuji nepodcenit výskyt tohoto patogenu.

V následujících dnech doporučujeme provést důkladné kontroly porostů a následné ošetření po kvetení révy! Ošetření provádějte při teplotách pod 25°C !!!

Padlí révy (*Erysiphe necator*)

V současné době jsou nezdědky nalézány masivní infekce, zpravidla tam, kde nebyla prováděna důsledná ošetření před kvetením révy. Podmínky pro rozvoj padlí v následujícím období jsou optimální, je očekáván vysoký infekční tlak tohoto patogenu. Po odkvětu révy je možné provést preventivní aplikaci Solfexu v dávce 20 kg/ha. V následujících dnech doporučuji provést důkladné ošetření porostů s přihlédnutím ke stavu porostu a výskytu patogenu.



Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [VitiSan](#) 6 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2% vinice bez výskytu patogenu

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 8 kg/ha + [WETCIT](#) 0,3% vinice s výskytem patogenu

Dávka vody **400 – 500 l** vody/ha

[Solfex](#) 20 kg /ha 3-4 dny po provedeném ošetření postřikem

Při masivním výskytu padlí je vhodnější použít jako smáčedlo [WETCIT](#) v dávce 0,3% pro zvýšení účinnosti tank mixu. Tato koncentrace je již od tohoto roku povolena!

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

Na porostech jsou nalézány olejové skvrny i sporulující mycelium patogenu na spodní straně listů. Na některých lokalitách je výskyt celkem masivní a zasaženy jsou mnohde i celá květenství. Při výskytu doporučujeme provést ošetření porostů vyššími dávkami a ve zkráceném intervalu 5 – 7 dnů od minulého ošetření.



Doporučené ošetření:

[Altela](#) 1 l/ha + [Flowbrix](#) 1 l/ha u BIO vinic bez výskytu patogenu

[Altela](#) 1,5 - 2 l/ha + [Flowbrix](#) 1,5 - 2 l/ha u BIO vinic s výskytem patogenu

[Alginure](#) 4,5 l/ha + [Flowbrix](#) 0,5 l/ha u vinic bez certifikace BIO v IP režimu

Dávka vody **400 - 500 l** vody/ha

Při výskytu plísně réвовé je důležité tyto porosty ošetřovat ve zkráceném termínu 5 – 7 dnů od posledního ošetření!!!

Agrotechnika

V černém úhoru již **nedoporučujeme provádět kultivaci** meziřadí, a tím uvolňovat dusík rostlinám, což je v následujícím období nežádoucí z důvodů zvýšení citlivosti k napadení rostlin padlím réвовým.

U porostů, kde je již dostatečný nárůst letorostů nad horní dvoj-drátí, doporučujeme provést první osečkování porostů, tak aby nedošlo k polehnutí letorostů.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

1) Válení porostu

nebo

2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12 - 15 cm.

Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů), doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3 - 5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4 l/ha.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se začíná objevovat vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#), obsahuje 13,2 % mikrorozpustný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Martin Vrabec

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 776 088](tel:+420732776088)

vrabec@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.