

Doporučení k biologické ochraně vinic 2/2025 – 6. 5. 2025

Situace

Aktuální vývojová fáze révy je většinou v rozpětí 5. - 6. vyvinutých listů podle odrůdy (BBCH 15–16). Díky vysokým teplotám v uplynulém období je růst révy rychlý. Na porostech je často viditelné poškození škůdci – kadeřavost, plstnatost (hálčivec révový a vlnovník révový). Na některých vinicích se projevuje nerovnoměrný růst SG, FR, VZ.

V následujícím období doporučujeme provést preventivní ošetření proti padlí révovému.



Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Prozatím ještě nejsou zaznamenávány výskyty mycelia padlí na révě vinné. U citlivých odrůd a vinic s opakujícím se výskytem doporučujeme provést preventivní ošetření. Toto ošetření má zároveň i akaricidní účinek.

Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [WETCIT](#) 0,1% standardní ošetření

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [Heliosol](#) 0,2% - při srážkově nestabilním počasí

Dávka vody 200 - 250 l vody/ha

Doporučujeme v této fázi použití práškové síry [Solfex](#) v dávce 10 kg/ha v odstupu 3 – 5 dnů po ošetření!

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

V současné době jsou již splněny podmínky zralosti oospor sum efektivních teplot (SET nad 8 °C = 170). Na většině lokalit zatím nejsou splněny podmínky vzniku primárních infekcí - pouze na lokalitě Hustopeče jsou již vlivem srážek tyto podmínky naplněny. Pokud budete provádět preventivní ošetření proti tomuto patogenu, doporučujeme jej provést pomocí elicitorů obranných reakcí z důvodu stimulace imunitních systémů rostlin.

Doporučené ošetření:

[Memcomba](#) 0,75 l/ha + [Wetcit](#) 0,1 %

Nebo

[UPSIDE](#) 2 l/ha + [Wetcit](#) 0,1%

Dávka vody 200–250 l vody/ha

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

V současné době probíhá let samců obalečů první generace. V následujícím období již bude možné na porostech v květenstvích nalézat housenky obalečů první generace.



Agrotechnika

V současné době je již možné provádět válení nebo seč, či mulčování porostu na výšku strniště min. 12 – 15 cm, a to jak u zeleného hnojení, tak i u druhově bohatých směsí.

V černém úhoru je možné provést kultivaci do hloubky cca 10 cm. A zároveň je vhodné provádět úpravu příkmených pásů.

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.



BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modřice
www.biocont-profi.cz