

Doporučení k biologické ochraně vinic č. 3/25 – 22. 5. 2025

Situace

V současném období se vinice nacházejí ve fázi 5. až 8. listu, podle odrůd a lokalit. Růst vinic je ovlivněn nízkými teplotami, vývoj je mírně opožděn oproti standardu normálního roku. Porosty se projevují světle zelenou barvou v důsledku nedostatečného příjmu živin za snížených teplot.

Na porostech se v tomto období vyskytuje padlí révové, přítomnost plísně révové zatím není zaznamenána.

Ze škůdců jsou na porostech zaznamenávány výskyty hálčivce révového a vlnovníka révového.

Doporučujeme provést důkladné prohlídky porostů na přítomnost patogenů.



Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Na porostech (listech i květenstvích) s opakovaným výskytem a na citlivých odrůdách (FR, CHAR, DORN), jsou již výskyty mycelia padlí viditelné pouhým okem. Přítomnost padlí na porostu byla nalezena v okolí Velkých Bílovic. V tomto období jsou optimální podmínky pro jeho rozvoj (teploty a ovlhčení).

Doporučujeme provést preventivní ošetření na porostech bez přítomnosti patogenu a kurativní ošetření porostů s výskytem padlí.



Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2% preventivní ošetření

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 3 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2 % kurativní ošetření u odrůd s výskytem padlí

Dávka vody 300 - 350 l vody/ha

V odstupu 2–3 dnů od postřiku doporučujeme provést aplikaci práškové síry [Solfex](#) v dávce 10 kg/ha

Plíseň révová (*Plasmopara viticola*)

V současném období není pozorována přítomnost patogenu na rostlinách, ani olejové skvrny na listech. Na většině lokalit nejsou splněny první cykly primárních infekcí.

Doporučujeme provést preventivní ošetření révy a tímto stimulovat rostliny k tvorbě látek podporující obranyschopnost před patogenem.

Doporučené ošetření:

[Memcomba](#) 0,5 – 0,75 l/ha + [Fertipen C \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha + [WETCIT](#) 0,2 %

Nebo

Upside 2 l/ha + [Fertipen C \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha + [WETCIT](#) 0,2 %

Dávka vody 300–350 l vody/ha

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

V současné době končí obalečů první generace. Nálet obalečů můžete sledovat na tomto odkazu:

<https://www.biocont-profi.cz/signalizace/obaleci/>

Agrotechnika

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

- 1) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12–15 cm.
- 2) V meziřadí se zeleným hnojením již mělo být provedeno sečení či mulčování porostů tak, aby co největší množství energie napoutané rostlinami, bylo zachováno přímo v půdě a zároveň docházelo ke krytí povrchu půdy a bránilo tak odparu vody z meziřadí.



Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů) doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3–5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4 l/ha.

Pro odstranění stresu z chladu je vhodné použití [STIMULUSu](#), do tank mixu v dávce 1 l/ha a tím rostlinám pomoci s regenerací po chladné periodě.

Doplnění bóru

Dále je možné před květem révy doplnit bór, pro zajištění plně klíčící pylu.

Možné použít [Tradebor Mo](#), který obsahuje bórethanolamin 105 g/l + molybden 12 g/l. **Doporučená dávka je 0,3 l/ha.** I v tomto případě je možné přidávat do tank mixu.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se začíná objevovat vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#), obsahuje 13,2 % mikrorozpusťný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.