

Doporučení k biologické ochraně vinic 4/2025 – 5. 6. 2025

Situace

Vinice se nacházejí ve fázi těsně před začátkem kvetení. Na teplých lokalitách u časně kvetoucí odrůdy CHAR již můžeme pozorovat odpadávající květní čepičky a začátek kvetení. Na ostatních odrůdách je předpokládáný začátek kvetení v nadcházejících dnech. Vyšší úhrny srážek předešlých dnů a dlouhá doba ovlhčení listů při optimálních teplotách jsou ideální pro vznik infekcí plísně révové.

Doporučujeme provést ošetření porostů v co nejdřívějším termínu.



Padlí révy (*Erysiphe necator*)

V současnosti jsou na některých lokalitách, zvláště u citlivých odrůd FR, pozorovány výskyty mycelia padlí - a to jak na listech, tak i na květenstvích. Je předpoklad, že nastanou optimální podmínky pro jeho rozvoj (teplota a ovlhčení porostů). Doporučujeme nepodceňovat tuto chorobu a provést důkladné ošetření.

Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 3 kg/ha

Dávka vody 300-400 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Ve srážkově nestabilním počasí doporučujeme použití smáčedla [HELIOSOL](#) v dávce 0,2 %, které snižuje riziko smyvu deštěm!

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

Zatím se na listech neobjevují olejové skvrny. Na většině lokalit jsou však splněny první cykly primárních infekcí. V tomto čase nastávají vlivem vyšších úhrnů srážek, dlouhého ovlhčení listů a vysoké vzdušné vlhkosti vhodné podmínky pro vznik sekundárních infekcí plísně réвовé. Doporučujeme provést důkladné ošetření porostů révy, před vznikem sekundárních infekcí.

Doporučené ošetření:

[Memcomba](#) 1 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1 – 1,5 l/ha nebo

[Upside](#) 2 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha

[Algisure](#) 3 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha vinice v režimu IP

Dávka vody 300-400 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Obaleč mramorovaný a obalečik jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

V následujícím týdnu bude probíhat líhnutí housenek motýlů obalečů první generace. Zpravidla je můžeme nalézat v mladých hroznech. Při velkém výskytu housenek první generace doporučujeme provést ošetření v následujících dnech.

Doporučené ošetření první generace:

[LEPINOX Plus](#) 1 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2 %

Doporučená dávka vody je 300 l do zóny hroznů.

Přípravek LEPINOX Plus NELZE mísit s přípravky VitiSan, Aquavitrin K, Flowbrix ani jiné Cu produkty!

LEPINOX Plus LZE mísit se Sírou BL a WETCIT.

Agrotechnika

V černém úhoru nedoporučujeme již v tomto období hýbat s půdou!!! A neuvolňovat dusík pro rostliny révy a zvyšovat tím riziko napadení houbovými chorobami.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

1) Válení porostu

nebo

2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12–15 cm.

Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů) doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3–5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4-5 l/ha.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se vyskytuje vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#) - obsahuje 13,2 % mikrorozpustný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.