

Doporučení k biologické ochraně vinic 5/2025 – 17. 6. 2025

Situace

Vinice se nacházejí v období plného kvetení, dokvétání a v některých případech již ve fázi špendlíkové hlavičky. Srážkové úhrny v předešlém období a dlouhá doba ovlhčení listů při optimálních teplotách jsou ideální pro vznik infekcí plísně révové.

V následujících dnech doporučujeme provést důkladnou kontrolu porostů a následné ošetření s přihlédnutím k aktuálnímu vývojovému stavu révy a množství spadných srážek.

Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Po odkvětu vstupuje réva do nejcitlivějšího období napadení padlím révovým. Jako v předešlém období jsou na citlivých odrůdách a lokalitách pozorovány výskyty patogenu na listech. U vinic po odkvětu je možné provést preventivní aplikaci Solfexu v dávce 20 kg/ha.

Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 3 kg/ha u vinic v době kvetení a dokvétání

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 6 kg/ha u vinic po odkvětu

Dávka vody 400-500 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Ve srážkově nestabilním počasí doporučujeme použití smáčedla [HELIOSOL](#) v dávce 0,2 %, které snižuje riziko smyvu deštěm!

Plíseň révová (*Plasmopara viticola*)

Vlivem optimálních klimatických podmínek (vysoké teploty v noci, srážky-ovlhčení listů), jsou již na některých lokalitách nalézány olejové skvrny i se sporulujícím myceliem patogenu na spodní straně listu. Při výskytu doporučujeme provést ošetření vyššími dávkami a ve zkráceném intervalu 5–7 dní.



Doporučené ošetření:

[Altela](#) 1 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1 l/ha nebo

[Upside](#) 4 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1 l/ha u vinic bez výskytu patogenu

[Altela](#) 1,5 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1,5 l/ha u vinic s výskytem patogenu

[Alginure](#) 4,5 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha vinice v režimu IP

Dávka vody 400-500 l/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Agrotechnika

V černém úhoru nedoporučujeme již v tomto období hýbat s půdou! A neuvolňovat dusík pro rostliny révy a zvyšovat tím riziko napadení houbovými chorobami.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

1) Válení porostu

nebo

2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12–15 cm.

Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů), doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3–5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4-5 l/ha.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se vyskytuje vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#) - obsahuje 13,2 % mikrorozpustný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.