


## Doporučení k biologické ochraně vinic 6/2025 – 2. 7. 2025

### Situace


Vinice se nachází ve fázi broku a hrachu, v některých případech dochází k uzavírání hroznů. Fytosanitární stav porostů je výborný. V současnosti jsou nalézány olejové skvrny plísně révové, mycelia padlí révového pouze sporadicky.

Na mnohých lokalitách se projevují místy silné chlorózy. Nemusí to být způsobeno pouze nedostatkem železa a ostatních mikroprvků, ale hlavní problém je špatná provzdušňenost půdy, ve které dochází k degradaci organické hmoty v anaerobním prostředí. Nadcházející období bude doprovázeno velmi vysokými teplotami a u vinic se může vyskytnout tepelný stres – přísušky.



### Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Na některých lokalitách (Čejkovice) byl pozorován větší výskyt napadení padlím révovým, a to jak na listech, tak i na hroznech. V těchto výjimečných případech doporučuji provést ošetření pomocí [COCANY](#) v 2% koncentraci. Toto kurativní ošetření se provádí do odlistěné zóny hroznů, tak aby byly hrozny plně omyty. Následně musí proběhnout standardní ošetření v plných dávkách.



### Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 6 kg/ha u vinic bez výskytu

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 8 kg/ha u vinic s častým výskytem

Dávka vody 400-600 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

[Solfex](#) 20 kg /ha 3-4 dny po provedeném ošetření postřikem

Ve srážkově nestabilním počasí doporučujeme použití smáčedla [HELIOSOL](#) v dávce 0,2 %, které snižuje riziko smyvu deštěm!

### Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

Na velké části jižní Moravy zatím nejsou na porostech pozorovány infekce patogenu. Jiná situace je v lokalitách Bzence a Polešovic, kde se vlivem vyšších srážkových úhrnů v minulých týdnech nalézají sporující mycelia plísně réвовé, a to jak na listech, tak i na hroznech. Následující ošetření by mělo být provedeno s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vinic.



### Doporučené ošetření:

[Altela](#) 1 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1 l/ha nebo

[Upside](#) 4 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1 l/ha u vinic bez výskytu patogenu

[Altela](#) 1,5 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1,5 l/ha u vinic s výskytem patogenu

[Algisure](#) 4,5 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha vinice v režimu IP

Dávka vody 400 - 600 l /ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

### Agrotechnika

V černém úhoru nedoporučujeme již v tomto období hýbat s půdou!!! A neuvolňovat dusík pro rostliny révy a zvyšovat tím riziko napadení houbovými chorobami, zejména padlím.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

1) Válení porostu

nebo

2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12–15 cm.

## Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

Pozvolna začíná nálet samců obalečů druhé generace do feromonových lapačů. Nálet obalečů můžete sledovat na adrese:

<https://www.biocont-profi.cz/signalizace/obaleci/>

## Křísek révový *Scaphoideus titanus*

Na většině sledovaných lokalit se vyskytují nymfy 3. instaru. Při výskytu tohoto škůdce je možné v integrovaném a EZ – BIO režimu použít insekticid [Pyregard](#). Je to kontaktní biologický insekticid na bázi přírodních pyrethrinů. Má velmi rychlou účinnost a rychlou degradaci reziduí. Ošetřovat doporučujeme v době bez plného slunečního svitu.

### Doporučené ošetření:

[Pyregard](#) 0,75 L/ha + [WETCIT](#) 0,2 %

Dávka vody **500 l** vody/ha na celou listovou stěnu

## Výživa

### Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů) doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3–5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4-5 l/ha.

### Stres způsobený vysokými teplotami

[STIMULUS](#) zvyšuje odolnost rostlin vůči UV záření a vysokým teplotám. Pro odstranění stresů je možné použít pomocný přípravek [STIMULUS](#), který zvyšuje aktivitu fotosyntézy a proteosyntézy, a tím zlepšuje celkovou vitalitu rostlin.

Doporučená dávka je **1 l/ha preventivně nebo 2 l/ha při viditelných projevech stresu.**

## Vrcholová chloróza


Na vinicích, kde se vyskytuje vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#) - obsahuje 13,2 % mikrorozpustný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1-1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.



## Zvýšení výnosu

Rostlinný biostimulant [Biimore](#) obsahující produkty fermentace bakterie *Corynebacterium glutamicum*. Tyto látky mají vliv na metabolické procesy. Zlepšují vývoj, zrání a velikosti plodů a vedou k celkovému zvýšení výnosů.

Doporučené dávkování je **100 ml/ha ve 2 aplikacích v i intervalu 14-21 dní**. První aplikace v období BBCH 75 (bobule velikosti hrášku).



Zvýšení výnosu po aplikaci Biimore (pokus CZ, 2024)

## Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

## Kontakty

**Ing. Tomáš Macan**

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

[macan@biocont.cz](mailto:macan@biocont.cz)

**Ing. Jiří Podhajský**

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

[podhajsky@biocont.cz](mailto:podhajsky@biocont.cz)

**Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.**