



Doporučení k biologické ochraně vinic 3/2026 – 2. 6. 2026

Situace

Vinice se nacházejí na začátku kvetení. U časně kvetoucích odrůd (např. CHAR, RŠ, Solaris) lze na některých lokalitách již pozorovat první projevy kvetení. U ostatních odrůd se očekává nástup kvetení v nadcházejících dnech, případně začátkem příštího týdne.

Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Byť v předchozím období panovaly pro rozvoj patogenu příznivé podmínky (teploty cca 24–30 °C), aktuálně jsou zaznamenávány pouze ojedinělé výskyty choroby.

Doporučené ošetření:

Varianta 1

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 3 kg/ha – standardní ošetření

Varianta 2

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [FytoSave](#) 2 l – ošetření s elicitorem obranyschopnosti rostlin

Dávka vody 350-400 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Ve srážkově nestabilním počasí doporučujeme použití smáčedla [Heliosol](#) v dávce 0,2 %, které snižuje riziko smyvu deštěm!

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

V současném období není pozorována přítomnost choroby na rostlinách (např. olejové skvrny na listech). Doporučujeme provést **preventivní** ošetření před začátkem kvetení révy a tímto stimulovat rostliny k tvorbě látek podporující obranyschopnost před patogenem.

Doporučené ošetření:

Varianta 1

[Memcomba](#) 0,75 l/ha + [FERTIPEN Cu \(Flowbrix\)](#) 0,75 l/ha vinice v režimu BIO a IP

Varianta 2

[UPSIDE](#) 2 l/ha+ [FERTIPEN Cu \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha vinice v režimu BIO a IP

Varianta 3

[Algisure](#) 3,5 l/ha + [FERTIPEN Cu \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha vinice v režimu IP

Dávka vody 350-400 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Ve srážkově nestabilním počasí doporučujeme použití smáčedla [Heliosol](#) v dávce 0,2 %, které snižuje riziko smyvu deštěm!

Agrotechnika

V černém úhoru nedoporučujeme již v tomto období hýbat s půdou! A neuvolňovat dusík pro rostliny révy a zvyšovat tím riziko napadení houbovými chorobami.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

- 1) Válení porostu
nebo
- 2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12–15 cm.

Výživa

U vinic se slabým vegetačním tlakem a u vinic s nerovnoměrným růstem s viditelnými projevy stresu je vhodné použití přípravku [STIMULUS](#). Doporučená dávka je 1–2 l/ha.

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů), doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[VermiFit A](#) v dávce 3–5 l/ha nebo [Hycol-E víno](#) v dávce 4-5 l/ha.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se vyskytuje vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#) - obsahuje 13,2 % mikrorozpustný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.