

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

Etiketa pro použití přípravku v rámci povolení na omezenou dobu nepřesahující 120 dnů (tj. od 1. 5. – 29. 6. 2024 a 15. 8. – 14. 10. 2023) podle čl. 53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) z 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117EHS a 91/414/EHS.

Povoleno Nařízením ÚKZÚZ č. j. UKZUZ 053404/2024 ze dne 2. 4. 2024.

AILANTEX®

Selektivní herbicid pro bodovou aplikaci ve formě suspenzního koncentrátu pro likvidaci pajasanu žláznatého.
PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Název a množství účinné látky:	<i>Verticillium nonalfalfae</i> kmen Vert56 1 x10 ⁶ ktj/ml
Název nebezpečné látky:	---
Signální slovo: ---	
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501	Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH208	Obsahuje <i>Verticillium nonalfalfae</i> . Může vyvolat alergickou reakci
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod./ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st.	Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Držitel povolení:	---
Právní zástupce:	---
Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku:	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel: 545 218 156, www.biocont-profi.cz
Omezené a kontrolované použití přípravku – evidenční číslo:	0000-312
Číslo šarže/ datum výroby formulace:	Uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 měsíce od data výroby; teplota skladování +4 až +8 °C
Množství přípravku v obalu:	HDPE lahvička 18 - 100 - 500 ml a 1 l

Způsob působení: suspenze konidií houby se aplikuje injektáží neředěného přípravku AILANTEX do xylému pajasanu žláznatého. Konidie jsou následně distribuovány cévním systémem stromu, a vytváří se lokální ložiska mycelia, která uvolňují enzymy a toxiny. V důsledku toho dojde k vadnutí a odumírání stromu. Při včasné aplikaci se mohou první příznaky objevit za 4–6 týdnů, u velkých stromů se efekt projeví většinou až v následujícím roce.

Návod k použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
nezemědělské plochy, cesty, lesy, parky, železnice, sady, vinice, okrasné rostliny	pajasan žláznatý	1-3 ml/ kmen	-		

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
nezemědělské plochy, cesty, lesy, parky, železnice, sady, vinice, okrasné rostliny	-	injektáž kmene stromu	1x	-

Upřesnění použití: Aplikace se provádí injektáží, kdy se do 1 až 3 x naseknutého kmene stromu aplikuje 1 ml suspenze přípravku v závislosti na velikosti stromu.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, nečlověkových organismů a složek životního prostředí: ---

Další omezení:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody. Přípravek nelze míchat s jinými přípravky na ochranu rostlin ani s pomocnými prostředky. Přípravek lze aplikovat aplikačním zařízením pro injektáž přípravku do dřeva (ideálně tlakovým zařízením). Při práci nepoužívat injekční stříkačky určené pro zdravotnictví.

Zamezte styku přípravku s kůží. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení OOPP. Po odložení OOPP se důkladně umyjte. Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte. Při ošetřování v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel doporučujeme upozornit návštěvníky na riziko zlomení či pádu ošetřených dřevin (např. pomocí informačních cedulí).

Obsahuje *Verticillium nonalfafae*, kmen Vert56. Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátory.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	vhodné ochranné rukavice např. gumové nebo plastové rukavice (označené piktogramem pro nebezpečí mikroorganismů podle ČSN EN ISO 374-5 nebo chemikáliím podle ČSN EN ISO 374-1) současně také odolné proti mechanickým rizikům
Ochrana očí a obličeje:	není nutná
Ochrana těla:	vhodný pracovní oděv (nezbytná podmínka – oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	uzavřená pracovní obuv (s ohledem na vykonávanou práci)
Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.	

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:	Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv. Zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou/vlažnou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí:	Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno.
První pomoc při náhodném požití:	Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.	

Skladování: AILANTEX® skladujte v původních obalech v suchých větratelných místnostech při teplotě +4 až +8 °C po dobu 2 měsíců. Po otevření spotřebujte do 3 dnů. Uchovávejte odděleně od skladovaných potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních přípravků a obalů od těchto látek. Neskladujte s kyselinami. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Likvidace obalů a zbytků: Oplachová kapalina nesmí být zasažena zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Použité obaly se nesmějí používat k jinému účelu! Zbytky přípravku a použité obaly se likvidují předáním odpovědné osobě.

Další údaje a upřesnění: před použitím suspenzi přípravku dobře protřepat. Dřevěnou paličkou zatlučte žlábek do bělového dřeva do hloubky 1,5 cm. Pipetou nebo stříkačkou kápnout max 3 ml přípravku do prohlubně drážky. Otevřená rána nasaje suspenzi spór. U stromu s průměrem nad 30 cm doporučujeme aplikovat 1 ml na každý ze 3 vpichů. Neaplikujte za slunečného počasí a teplotě nad 25 °C. V závislosti na velikosti stromu lze odstupňovat dávkování následovně: 1 ml/ kmen ø do 15 cm; 1,5 ml /kmen ø 15–30 cm; 3 ml/kmen ø nad 30 cm.

Při ošetřování (způsob aplikace – stromová injektáž) v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je vhodné oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- po dobu aplikace zamezit/omezit vstup osob a pohyb zvířat na pozemek s ošetřenými stromy;
- jedná-li se o areály, které lze uzavřít, je žádoucí tak po dobu aplikace učinit.

Příprava aplikační kapaliny: ---

Čistění zařízení pro aplikaci přípravku: dlátko, pipetu či stříkačku vypláchněte vodou. Opakujte 2x. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.