



Biimore

Kapalný biostimulant získaný fermentací specifického kmene bakterie *Corynebacterium glutamicum*

- ✓ ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI PLODŮ
- ✓ ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI TRSU
- ✓ ZLEPŠENÍ PEVNOSTI PLODŮ
- ✓ PRODLOUŽENÍ SHELF LIFE PLODŮ



Naskenujte QR kód

pro stažení etikety

Tyto látky mají vliv na expresi genů a ovlivňují metabolické procesy, které následně zlepšují vývoj, zrání a velikost plodů a vedou k celkovému zvýšení výnosů.



Zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, produkci cukrů, ukládání draslíku, zlepšuje stavbu buněčných stěn a membrán.

Doporučené dávkování:




25–75 ml/ha

Biimore má vysokou účinnost při nízkém dávkování.

Zelenina




Aplikovat v **10-14 denních intervalech**.

Na rajčata – **min. 2 aplikace** nebo při každém kvetení dvěma aplikacemi.



Okrasné rostliny a léčivé a aromatické byliny:

1-3 aplikace za pěstitelský cyklus, nejvyšší dávku aplikujte po řezu dvěma aplikacemi.



Mísitelnost:

Kompatibilní s většinou běžně používaných hnojiv a agrochemikálií kromě silně alkalických.

Před použitím dobře protřepejte.

Podmínky skladování:

Produkt uchovávejte v původním obalu, na suchém místě, mimo sluneční svit.

Skladujte v rozmezí teplot -5 až 45°C.

Kontakty



Ing. Pavel Mitáš
Obchod a poradenství

+420 733 186 591

mitas@biocont.cz



Ing. Lukáš Posák
Obchod a poradenství

+420 737 813 323

posak@biocont.cz

