

# SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN


Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

## SPINTOR 240 SC

Obchodní název referenčního přípravku: SpinTor

Insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy, jabloní, zeleniny proti housenkám škůdců

**PROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL**

<b>Název a množství účinné látky:</b>	Spinosad 240 g/l (22,8 % hm.)
	VAROVÁNÍ
<b>H410</b>	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
<b>P280</b>	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv
<b>P273</b>	Uniklý produkt seberte
<b>P501</b>	Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora
<b>EUH401</b>	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
<b>EUH208</b>	Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
<b>SP1</b>	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod./ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. Přípravek <b>je vyloučen</b> z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do jabloní, révy a zeleniny, jadravin, okrasných rostlin a ovocných a okrasných školek vyšších jak 150 cm.	
<b>Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné označení přípravku:</b>	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel: 545 218 156, www.biocont.cz
<b>Evidenční číslo přípravku:</b>	4515-0D/1
<b>Číslo šarže/ datum výroby formulace:</b>	Uvedeno na obalu
<b>Doba použitelnosti:</b>	2 roky od data výroby, teplota skladování + 5 °C až + 30 °C
<b>Množství přípravku v obalu:</b>	PET láhev 0,5 l a 1 l

**Způsob působení:** SpinTor 240 SC obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií *Saccharopolyspora spinosa*, která se běžně vyskytuje v půdě. SpinTor působí jako požerový a kontaktní insekticid. Příjem účinné látky škůdci nastává příjmem potravy i přímým kontaktem s látkou. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě). Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

### Návod k použití:

1)plodina, oblast použití	2)škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1)k plodině 2)k ŠO 3) k OL	4)Poznámka k dávkování 5)Umístění 6)Určení sklizně
brambor	mandelinka bramborová	0,15 l/ha	7	2) podle signalizace, přednostně na L1 a L2	
réva	obaleči	0,2-0,3 l/ha	14	2) vyšší dávka se doporučuje na 2. generaci škůdce, podle signalizace	
květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice	housenky motýlů	0,3-0,4 l/ha	3	2) podle signalizace, vyšší dávka při vyšší intenzitě výskytu	
květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice	můra zelná	0,4 l/ha	3	2) podle signalizace	

jabloň	obaleč jablečný, obaleči slupkový a pupenový	0,6 l/ha	7	2) podle signalizace	
pór, cibule	třásněnka zahradní	0,4 l/ha	7	2) podle signalizace	
paprika skleníková, rajče skleníkové	třásněnka západní	0,04 %	3	2) podle signalizace	

OL - (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	300–500 l/ha	postřik, rosení	2x	7 dnů
réva	400–600 l/ha	postřik, rosení	2x/rok	10 dnů
květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice	600–800 l/ha	postřik, rosení	2x	10 dnů
jabloň	400–600 l/ha	postřik, rosení	2x/rok	7-9 dnů
pór, cibule	600 l/ha	postřik, rosení	2x	10 dnů
paprika skleníková, rajče skleníkové	500–1000 l/ha	postřik	2x	

**Upřesnění použití:** K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku spinosad ze skupiny spinosynů po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku, a ne více než 2 x za vegetační období.

**Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:**

**SPe3:** Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m při aplikaci do révy a 5 m při aplikaci do jablek vzhledem k povrchové vodě.

**Riziko pro ostatní necílové členovce:** zvláště nebezpečný. Při použití ve sklenících nelze vyloučit riziko pro biologickou ochranu na bázi makroorganismů. Při použití přípravku ve sklenících s introdukovanými opylovači: Zabraňte expozici opylovačů zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. Při aplikaci je třeba se vyvarovat přímého kontaktu postřikové jichy se včelami.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob, a to tak, aby postřikovač i další osoby nebyly zasaženy. Postřik nesmí zasáhnout další porosty.

**Další omezení:** Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob, a to tak, aby postřikovač i další osoby nebyly zasaženy. Při práci a po jejím skončení až do odložení pracovního oděvu a OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. Přípravek nesmí při manipulaci a použití ani v malém množství zasáhnout jakékoli okolní porosty! Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

#### Osobní ochranné pracovní prostředky:

<u>Ochrana dýchacích orgánů:</u>	není nutná
<u>Ochrana rukou:</u>	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1
<u>Ochrana očí a obličeje:</u>	není nutná, při míchání přípravku použijte ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
<u>Ochrana těla:</u>	celkový pracovní ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka). Pracovní ochranný oděv proti kapalným chemikáliím podle ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340
<u>Dodatečná ochrana hlavy:</u>	čepice se štítkem nebo klobouk
<u>Dodatečná ochrana nohou:</u>	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)
<u>Společné údaje k OOPP:</u>	poškozené OOPP (např. protřené rukavice) je třeba vyměnit; rukavice a jakýkoli speciální ochranný oblek není třeba použít, pokud je ochrana osoby technicky zabezpečena před nebezpečnými látkami v traktoru např. podle ČSN EN 15695-1 a ČSN EN 15695-2.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. Při ruční aplikaci v sadu lze doporučit další výše neuvedené OOPP jako ochrana proti promočení

**Informace o první pomoci: Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.

**První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:** Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc, zajistěte ošetření.

**První pomoc při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte mýdlem a pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte ošetření.

**První pomoc při zasažení očí:** Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou, pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte ošetření.

**První pomoc při náhodném požití:** Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu že je postižený při vědomí), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu přípravku, popř. obal nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem:**

**Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

**Skladování:** Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, dezinfekčních prostředků a hnojiv a obalů od těchto látek při teplotách +5 až +30 °C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

**Likvidace obalů a zbytků:** Prázdné obaly přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k recyklaci, nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 až 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Použité nářadí, nástroje, zařízení a pomůcky se asanují 3 % roztokem uhlíčitanu sodného (sody) a omyjí vodou. Před použitím přípravku přečtěte pozorně návod k použití! Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se naředí 1:5 vodou a bezzbytku se vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

**Další údaje a upřesnění:**

**Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským**

**Menšinová použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009**

**Návod k použití:**

1)plodina, oblast použití	2)škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1)k plodině 2)k ŠO 3) k OL	4)Poznámka k dávkování 5)Umístění 6)Určení sklizně
brambor	dřepčící rodu Epitrix	0,15 l/ha	7	2) podle signalizace	
cibule šalotka, česnek	třásněnky	0,4 l/ha	7	2) při výskytu	5) venkovní prostory
cibule	třásněnky	0,3 l/ha	14		5) venkovní prostory 6) na nať
cuketa	vrtalky	0,4 l/ha	3	2) při výskytu	5) skleníky
okurka	minující škůdci, třásněnky	0,3 – 0,6 l/ha	3		5) skleníky
rajče, baklažán	makadlovka <i>Tuta absoluta</i>	0,4-0,8 l/ha	3	2) od začátku výskytu housenek	5) skleníky
rukola setá	minující škůdci	0,4 l/ha	7	2) od začátku výskytu	5) venkovní prostory
salát	listožravé housenky motýlů	0,4 l/ha	14	2) při výskytu	5) venkovní prostory
špenát	minující škůdci, třásněnky, housenky motýlů, květilky	0,2 l/ha	14	1) od BBCH 15	5) venkovní prostory
zelí, květák, kapusta růžičková, brokolice	květilka zelná	14 ml/ 1000 rostlin	AT	1) před výsadbou ve f. BBCH 12 2) při výskytu	5) skleníky, fóliovníky, venkovní prostory – otužovaná sadba
kedluben	housenky motýlů	0,2 l/ha	3	1)od: 15 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní prostory
pažitka	třásněnky	0,2 l/ha	7	1)od: 13 BBCH	5) venkovní prostory
pažitka	minující škůdci, molík česnekový	0,2 l/ha	7	1)od: 16 BBCH	5)venkovní prostory
jetel luční	nosatčící rodu Apion	0,4 l/ha	AT	1) před květem až první rozkvetlé hlávky 2) podle signalizace	6) semenné porosty
jádroviny	octomilka japonská	0,4-0,6 l/ha (400-600 l vody/ha)	7	1)od: 81 BBCH, do: 87 BBCH 2) při výskytu	
třešeň, višev	octomilka japonská	0,3 l/ha	5	1)od: 81 BBCH, do: 87 BBCH 2) při výskytu	
jahodník	octomilka japonská	0,3 l/ha (1000-1500 l vody/ha)	1	1)od: 71 BBCH, do: 89 BBCH 2) při výskytu	
maliník, ostružiník	octomilka japonská	0,4 l/ha (800-1500 l vody/ha)	3	1)od: 81 BBCH, do: 89 BBCH 2) při výskytu	
borůvka, brusnice brusinka	octomilka japonská	0,4 l/ha	3	1)od: 79 BBCH, do: 87 BBCH 2) při výskytu	
rybíz, angrešt	octomilka japonská, nesytkva rybízová	0,4 l/ha	3	1)od: 75 BBCH, do: 87 BBCH 2) při výskytu	
rybíz, angrešt	polník rybízový, polník zelenavý	0,4 l/ha	3	1)od: 87 BBCH, do: 89 BBCH 2) při výskytu	

třešeň, višeň	vtule třešňová, vtule višňová	0,3 l/ha	5	1)od: 81 BBCH, do: 87 BBCH 2) při výskytu	
třešeň, višeň	nosatci	0,3 l/ha	5	1) od: 71 BBCH, do: 89 BBCH	
okrasné rostliny	listožravé housenky	0,4 l/ha	AT	2 při výskytu	
okrasné rostliny	třásněnky	0,3 l/ha	AT	2) při výskytu	
okrasné rostliny	dřepčící	0,6 l/ha	AT	2) při výskytu	
ovocné školky, okrasné školky	třásněnky, žravý hmyz	0,6 l/ha	AT	2) při výskytu	
jabloň, hrušeň	mery	0,8 l/ha 200-1000 l vody/ha)	7	2) podle signalizace	
jabloň	květopas jabloňový	0,6 l/ha (500-1000 l vody/ha)	7	1) od: 53 BBCH, do: 74 BBCH	
jabloň	nosatci	0,3 l/ha (1000-1500 l vody/ha)	7	1) od: 71 BBCH, do: 89 BBCH	
hrušeň	květopas hrušňový	0,6 l/ha (500-1000 l vody/ha)	7	1) Ve f. 91 BBCH	
rakytník řešetlákový	vtule rakytníková	0,4 l/ha	3	1) od: 71 BBCH, do: 87 BBCH	
ořešák vlašský	vtule ořešková	0,15 l/ha	30	1) od: 31 BBCH, do: 89 BBCH	
jahodník	květopas jahodníkový	0,3 l/ha (1000-2000 l vody/ ha)	1	1) před květem	5) venkovní prostory
maliník, ostružiník	malinovník plstnatý, třásněnky, mšice, květopas jahodníkový	0,2 l/ha (200-1000 l vody/ha)	3	2)podle signalizace	
réva	octomilka japonská	0,3 l/ha	14	1) od: 85 BBCH, do: 89 BBCH	
kedluben	housenky motýlů	0,2l/ha	3	1) od: 15 BBCH do: 49 BBCH	5) venkovní prostory
pažitka	třásněnky	0,2 l/ha	7	1) od: 13 BBCH	5) venkovní prostory
pažitka	minující škůdci, molík česnekový	0,2 l/ha	7	1) od: 16 BBCH	5) venkovní prostory

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	200–600 l/ha	postřik	2x	7 dnů
cibule na nať	200-600 l/ha	Postřik	2x	10–14 dnů
cibule šalotka, česnek	600 l/ha	postřik	2x	10 dnů
cuketa	600–800 l/ha	postřik	2x	7-10 dnů
okurka	400–1200 l/ha	postřik	2x	7-10 dnů
rajče, baklažán	600–1200 l/ha	postřik, rosení	4x	10–14 dnů
salát	600–800 l/ha	postřik	2x	7-10 dnů
špenát, rukola setá	400–600 l/ha	postřik	2x	10-14 dnů
zelí, květák, kapusta růžičková, brokolice	5 l/ 1000 rostlin	zálivka	2x	
jetel luční	300–400 l/ha	postřik	1x za rok	
okrasné rostliny	200 – 1 000 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7-10 dnů
okrasné školky, ovocné školky	200 – 1 000 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	
borůvka, brusnice brusinka	800–1500 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů
jahodník	1 000 – 2 000 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	octomilka 7 dnů, květopas 10 dnů
maliník, ostružiník	200–1500 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	10 dnů, octomilka 7-10 dnů
rybíz, angrešt	1000 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů
jádroviny	400–800 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7-9 dnů
jabloň, hrušeň	200–1500 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7-10 dnů
třešeň, višeň	1000–1500 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů nosatci 7-10 dnů
rakytník řešetlákový	800–1500 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů
ořešák vlašský	600-1000 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	7 dnů
kedluben	400-600 l/ha	postřik	2x	10-14 dnů
pažitka	200-600 l/ha	postřik	2x	7-14 dnů
réva	400-600 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7-9 dnů

#### **Odstupňování dávek pro rajče, baklažán –**

##### **makadlovka *Tuta absoluta*:**

Výška rostliny do 50 cm: 0,4 l/ha

Výška rostlina 50–125 cm 0,6 l/ha

Výška rostliny nad 125 cm (rajče): 0,8 l/ha nebo 0,04-0,08%

##### **Odstupňování dávek přípravku v okurkách:**

Výška rostliny do 50 cm: 0,3 l/ha v 600 l vody

Výška rostlina 50–125 cm: 0,45 l/ha v 900 l vody

**Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů**

Plodina	Bez redukce	Tryska 50%	Tryska 75%	Tryska 90%
<b>Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)</b>				
Jabloň., hrušeň	25	16	12	4
Třešeň, višně	35	25	14	8
Špenát, kedluben, jahodník	4	4	4	4
Réva	3	3	3	3
Jetel luční – semenné porosty	7	4	4	4
Jádroviny	50	35	25	12
Ořešák vlašský	35	25	14	8
Maliník, ostružiník, borůvka, brusinka, rybíz, angrešt, rakytník	25	14	9	6
Okrasné rostliny a ovocné a okrasné školky do 150 cm	4	4	4	4
Okrasné rostliny a ovocné a okrasné školky nad 150 cm	18	12	6	4
<b>Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)</b>				
Jabloň, hrušeň, jádroviny	20	15	10	0
Třešeň, višně, ořešák vlašský	10	0	0	0
Maliník, ostružiník, borůvka, brusinka, rybíz, angrešt, rakytník	10	5	0	0
Okrasné rostliny a ovocné a okrasné školky do 50 cm	5	0	0	0
Okrasné rostliny a ovocné a okrasné školky 50–150 cm	10	5	5	0
Okrasné rostliny a ovocné a okrasné školky nad 150 cm	15	10	10	0

**Jabloň, hrušeň:** za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 25$  m.

**Třešeň, višně, ořešák vlašský:** za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 35$  m.

**Jetel luční:** za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 7$  m.

**Jádroviny (octomilka japonská):** za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 50$  m.

**Maliník, ostružiník, borůvka, brusinka, angrešt, rybíz, rakytník:** za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 25$  m.

**Okrasné rostliny, ovocné a okrasné školky nad 150 cm:** za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 18$  m.

ÚKZÚZ v rámci povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

**Příprava aplikační kapaliny:** Odměřené množství vsypeme do nádrže postřikovače zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při přípravě směsi je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapaliny je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

**Čistění zařízení pro aplikaci přípravků:** Po vyprázdnění nádrže aplikační zařízení (nádrž, ramena, trysky) vypláchněte vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače). Opakujte 2x. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. Trysky a sítká musejí být čišťeny odděleně před a po proplachování.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, ne jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

#### Upozornění:

Před použitím přípravku si přečtěte přiložené pokyny.

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce ani distributor neručí.

**Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci.  
BIOCONT LABORATORY – biologická ochrana rostlin**