




STÁJE BEZ MUCH

Biologická ochrana proti nežádoucímu
hmyzu v chovech hospodářských zvířat



OD ROKU 2013 ÚSPĚŠNĚ
ZAVÁDÍME TYTO METODY V ČR



SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKY
Z AKADEMICKÉHO PROSTŘEDÍ



MÁME KOMPLETNÍ PORTFOLIO
K BOJI PROTI HMYZU V CHOVECH




POSTARÁME SE O VEŠKERÝ
SERVIS VČETNĚ PORADENSTVÍ
OHLEDNĚ DOTACÍ A APLIKACÍ



ZAJISTÍME BEZPROBLÉMOVÉ
DODÁVKY PRODUKTŮ


**Nabízíme komplexní řešení problémů
s obtěžujícím hmyzem v chovech dojeného
i masného skotu, prasat a drůbeže.**



**NASKENUJTE
QR KÓD**
ke zhlédnutí
našeho videa!



NAŠE PORTFOLIO



NABÍZÍME ŘEŠENÍ PROTI KAŽDÉMU
VÝVOJOVÉMU STÁDIU MUCH

VEŠKERÉ BIOAGENS JSOU MNOŽENÉ
LABORATORNĚ, TEDY BEZ RIZIKA
ZAVEDENÍ NEŽÁDOUCÍCH PATOGENŮ

NIJAK NEŠKODÍ CHOVANÝM
ZVÍŘATŮM A NEJSOU
PRO NĚ OBTĚŽUJÍCÍ



NASKENUJTE
QR KÓD
a dozvíte se více
o našem portfoliu



www.biocont-profi.cz
www.stajebezmuch.cz




JAK ŠKODÍ MOUCHY?

- Pokles dojivosti
- Přenos nemocí
- Negativní dopad na pohodu zvířat (welfare)
- Snížení intenzity růstu

Dle výzkumů v ČR v době zamoření mouchami
dosahují ztráty v produkci mléka
u skotu **až 0,68 kg na kus a den.**

výsledky prezentované doc. Ing. Danielem Faltou, Ph. D.,
SCHČSS Skalský dvůr, 2016



BIOLOGICKÁ OCHRANA


Tato metoda spočívá ve využití přirozených
nepřátel (antagonistů) mouchy a redukci
její populace už v raných stádiích vývoje.

- Efektivní preventivní opatření
- Šetrná vůči chovaným zvířatům,
personálu farmy i životnímu prostředí
- Nehrozí vznik rezistence

ŽIVÉ ORGANISMY JAKO BIOLOGICKÁ METODA BOJE PROTI MOUCHÁM

Biopar

Muscidifurax raptorellus



Tuto cca 2 mm velkou vosičku dodáváme ve formě naparazitovaných kukel mouchy domácí, z nichž se vosička vyvíjí. Aktivně poté vyhledává kukly much, do nichž klade svá vajíčka a dává tak základ další generaci, která se vyvíjí v průběhu 2-3 týdnů.

POUŽITÍ:
u dojeného skotu

MACRO-MITE

Macrocheles robustulus



Dravý roztoč *Macrocheles robustulus* napadá především vajíčka a nižší larvální stádia much. Je aktivní při teplotách nad 15°C a dokáže redukovat populaci mouchy domácí, octomilky obecné a i bodalky malé.

POUŽITÍ:
u masného i dojeného skotu a prasat

Biofly

Ophyra aenescens



Larva dravé mouchy *Ophyra* se živí larvami mouchy domácí. Dodáváme ji ve formě naparazitovaných kukel, z nichž se líhnou dospělci a ti kladou vajíčka v podroštových prostorech. Na prasata nenesadí a zdržují se na stinných místech.

POUŽITÍ:
v zaroštovaných stájích pro prasata



Obsah sáčku vsypejte
do vypouštěcí stanice.



PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

- ✓ MÁME DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI S BIOLOGICKOU OCHRANOU VE STÁJÍCH
- ✓ ZAŠKOLÍME VÁŠ PERSONÁL O SPRÁVNÉ APLIKACI A DÁVKOVÁNÍ
- ✓ DOPORUČÍME OPATŘENÍ INDIVIDUÁLNĚ VAŠIM POTŘEBÁM
- ✓ ZAJISTÍME PRAVIDELNÉ A BEZPROBLÉMOVÉ DODÁVKY
- ✓ OSOBNÍ NÁVŠTĚVY A KONZULTACE JSOU SOUČÁSTÍ NAŠICH SLUŽEB
- ✓ PORADÍME S VYŘÍZENÍM DOTACÍ

Zdroj foto: @Koppert Biological Systems



Ing. Petr Švingr
Obchodní zástupce a poradce
+420 739 845 515
svingr@biocont.cz



Michal Grošov
Objednávky, distribuce
+420 736 792 502
grosov@biocont.cz



doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Externí poradce, akademický pracovník
Agronomické fakulty MENDELU
daniel.falta@mendelu.cz

